



Vaccination anti-COVID Avis spécialisé en Allergologie

SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL ET DE PATHOLOGIES PROFESSIONNELLES-PHARMACOVIGILANCE-MALADIES INFECTIEUSES-ALLERGOLOGIE

Rappel des recommandations Nationales et européennes*

CONTRE-INDICATIONS ALLERGOLOGIQUES:

NÉCESSITÉ D'AVIS SPÉCIALISÉ
UNIQUEMENT SI ANTECEDENTS
D'ALLERGIE IMMEDIATE :

- A un des composants du vaccin, avérée ou fortement suspecte, quelle que soit la sévérité (PEG ou Macrogol, Trométamol*, Polysorbate 80 ou tween)
- *Si allergie aux produits de contraste : contre-indiquer Moderna
- A une première injection du vaccin COVID, survenant dans les 6 heures, si grave (manifestations évoquant une réaction anaphylactique sévère : respiratoire, cutanée, digestive ou hémodynamique)
- A un vaccin ou médicament non identifié

LES AUTRES PATIENTS :

Les allergies suivantes, quelle que soit leur sévérité, ne sont **pas une contre-indication** à la vaccination contre la Covid-19 et ne **NÉCESSITENT DONC PAS D'AVIS SPÉCIALISÉ** avant la vaccination :

- Allergies cutanées de contact
- Allergies au venin d'hyménoptères (abeille, guêpe, frelon) SAUF si mastocytose ou suspicion de mastocytose
- Allergènes inhalés (acariens, pollens, squames d'animaux, moisissures)
- Allergies alimentaires
- TOUT autre antécédent allergique

DEMANDES D'AVIS AUPRÈS DU SERVICE D'ALLERGOLOGIE AU CHU DE RENNES:

Les demandes d'avis sont à adresser :

- **En Allergologie:** Ligne d'avis au 02 99 28 83 88, du lundi au vendredi (horaires précisés sur répondeur).
- **Auprès du Centre Régional de Pharmacovigilance (CRPV)** pour connaître les médicaments à risque ou contenant des excipients à risque: 02 99 28 43 63 de 9h00 à 18h00, du lundi au vendredi.
- **Allergologues libéraux:** des avis spécialisés en consultation de ville sont possibles.

En dehors de ces horaires, vous pouvez **surseoir à la vaccination.**

- Les avis ne seront donnés **qu'aux professionnels de santé** (médecins vaccinateurs ou médecins traitants du patient).
- **Nous ne serons plus en mesure d'assurer une réponse à partir du 21/05/21** aux demandes d'avis à l'adresse mail médicale AvisAllergoVaccinCovid@chu-rennes.fr
- Les patients avec **mastocytose systémique** seront vaccinés en centre de vaccination, après prémédication anti-H1 per os, et surveillés 30 minutes, ou à l'hôpital en cas **d'antécédent d'anaphylaxie** (auquel cas, nous invitons le médecin généraliste à se mettre en relation avec le spécialiste référent de son patient pour l'organisation de sa prise en charge) .

* Société Française d'Allergologie (SFA), la FFAL (Fédération Française d'Allergologie), le Collège National Professionnel d'Allergologie (CNP), le TRAM (Groupe de Travail Allergie Médicamenteuse), l'HAS, et l'EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology)

Vaccination contre la Covid-19 et antécédents allergiques. Résumé des recommandations Françaises (SFA/FFAL/CNP allergologie) sur la conduite à tenir

Manifestations allergiques	Conseil pour la vaccination	Durée de surveillance après vaccination	Conduite à tenir spéciale
Antécédent d'allergie à un des composants du vaccin, en particulier aux polyéthylène-glycols et par risque d'allergie croisée aux polysorbates	Contre indiqué	Non vacciné	Adresser en allergologie
Antécédent de réaction immédiate ^{1,2} à une première injection d'un vaccin ARNm COVID 19	Contre indiqué	Non vacciné	Adresser en allergologie
Antécédent de réaction immédiate ^{1,2} à un autre vaccin ou à un médicament non identifié	Surseoir	Vacciné après avis d'expert	Adresser en allergologie
Toute autre antécédent allergique	Vaccination normale	15 à 30 minutes	

1 Bronchospasme, urticaire généralisée, anaphylaxie

2 Hors réaction locale qui autorise la vaccination avec 15 min de surveillance

1- Vaccination contre la Covid-19 et antécédents allergiques. Résumé des recommandations Françaises (SFA/FFAL/CNP allergologie) sur la conduite à tenir : <https://www.dropbox.com/s/uhkomp3zg9rvqi9/Tableau%20%C3%A9sum%C3%A9%20des%20recommandations%20Fran%C3%A7aises%20V2.pdf?dl=0>

2- Recommandations Européennes : European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Sokolowska M, Eiwegger T, Ollert M, Torres MJ, Barber D, et al. EAACI statement on the diagnosis, management and prevention of severe allergic reactions to COVID-19 vaccines. Allergy 2021. <https://doi.org/10.1111/all.14739>

3- Stratégie de vaccination contre le SARS-CoV-2 - Extension des compétences vaccinales des professionnels de santé : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3240075/fr/strategie-de-vaccination-contre-le-sars-cov-2-extension-des-competences-vaccinales-des-professionnels-de-sante